



تعيم رقم 34
تعريف حالات داء الليشمانيات الجلدي والمخاطي (حبة حلب)
Leishmaniose cutanée et cutanéo-muqueuse
Cutaneous Leishmaniasis

يعتمد التعريف التالي لداء الليشمانيات الجلدي والمخاطي (حبة حلب)، الواجب الإبلاغ عنها إلى وزارة الصحة العامة:

حالة مشتبهة	
شخص له عوارض سريرية: آفة جلدية أو في الأغشية المخاطية (عيادات، فرحة غير مؤلمة، التنمّام متفرّج...).	
العارض الجلدية: ظهور آفة أو أكثر بشكل نمطي على الأجزاء المكشوفة من الجلد. الأماكن الأكثر اصابة هي الوجه والرقبة والذراعين والساقيين. في مكان دخول الطفيليّات، تظهر عقيدة قد تكبر لتصبح فرحة قليلة الإيلام. تظل الفرحة في هذه المرحلة لفترة متغيرة قبل الشفاء وتترك عادة ندبة منخفضة. ومن الممكن ظهور أشكال أخرى. عند بعض الأشخاص، تنتشر ذريات محددة وتسبب آفات مخاطية، وقد تشمل الأنسجة الأنفية والبلعومية وقد تكون مشوهة.	Cas suspect

Une personne présentant des signes cliniques : lésion cutanée ou cutanéo-muqueuse (nodule, ulcération non douloureuse, cicatrice excavée...)	Suspected case
Les lésions cutanées : Présence d'une ou de plusieurs lésions, habituellement sur les parties découvertes du corps : elles sont le plus souvent localisées au niveau de la face, du cou, des bras et des jambes. Il apparaît au point d'inoculation un nodule qui peut grossir et évoluer vers une ulcération indolore. La lésion reste à ce stade pendant un temps plus ou moins long avant de guérir en laissant ordinairement derrière elle une cicatrice déprimée. Il existe d'autres formes atypiques. Chez quelques malades, certaines souches peuvent se disséminer et provoquer des lésions au niveau des muqueuses. Ces séquelles concernent les tissus rhinopharyngés et peuvent être défigurantes.	---
A person with clinical signs: skin or mucosal lesions (nodule, indolent ulcer, depressed scar...).	Suspected case
The skin lesions: appearance of one or more lesions typically on uncovered parts of the body. The face, neck, arms and legs are the commonest site. At the site of inoculation, a papule appears which may enlarge to become an indolent ulcerated nodule or plaque. The sore remains in this stage for a variable time before healing and typically leaves a depressed scar. Other atypical forms may occur. In some individuals, certain strains can disseminate and cause mucosal lesions. These sequelae involve nasopharyngeal tissues and can be disfiguring.	---

<ul style="list-style-type: none"> - مع تشخيص للطفيليات: تشخيص مجهرى مع وجود نماذج ملونة أو زرع ايجابي للليشمانيا من عينات الافات - مع / او ، في حال داء الليمشمانيات المخاطي، تشخيص مصلى: الضد المتألق اللامباشر IFA، او ايجابية تفاعلات الاليزا ELISA <p style="text-align: center;">---</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec confirmation parasitologique du diagnostic : frottis (frottis coloré) ou culture (culture positive de <i>Leishmania</i> à partir des lésions) - Et/ou, pour la leishmaniose cutanéo-muqueuse seulement, une confirmation sérologique : immunofluorescence, ELISA. <p style="text-align: center;">---</p> <p>A suspected case with laboratory confirmation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - With parasitological confirmation: positive stained smear or positive culture from lesion of <i>Leishmania</i> - And/or, for mucosal leishmaniasis only, serological confirmation: immunofluorescent assay, ELISA. 	حالة مثبتة Cas confirmé Confirmed case
B55.1, B55.2	رمز المرض ICD-10 / CIM-10

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمار

يبلغ:
 مديرية الوقاية الصحية
 مصلحة الطب الوقائي
 وحدة الترصد الوبائي
 دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية
 مصالح الصحة في المحافظات
 أقسام الصحة في الأقضية
 نقابة أطباء في لبنان والشمال
 نقابة المستشفيات الخاصة
 المحفوظات