



إرشادات عامة حول استعمال لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13

بناءً على التعميم رقم 167 (بتاريخ 15 كانون الأول 2015) حول إدخال لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13 إلى الرزنامة الوطنية للقاحات، يطلب إلى كافة طباطب الأفضية ومراكز توزيع اللقاحات والمراكز الصحية والمستوصفات الإلتزام بالإرشادات التالية:

أولاً:

يعطى لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13 للأطفال دون السنة فقط على الشكل التالي:

جرعة أولى في عمر 4 أشهر

جرعة ثانية في عمر 6 أشهر

جرعة تذكيرية في عمر 12 شهراً

ثانياً:

يعطى اللقاح عبر إبرة في العضلة الأمامية لمنطقة الفخذ، ويتم فسخ مساحة كافية في حال إعطاء أكثر من إبرة في نفس المنطقة خلال جلسة التطعيم الواحدة.

ثالثاً:


يحفظ اللقاح في براد اللقاحات على الرف الأوسط في درجة حرارة مئوية بين 2+ و 8+، و يمنع منعاً باتاً تجميد اللقاح.

رابعاً:

تحفظ عبوات اللقاح الفارغة بعد الإستعمال وتسلم نهاية كل شهر مع التقرير الشهري للقاحات إلى طبابة القضاء التي تسلمها بدورها إلى المستودع المركزي في الكرنيتينا.

خامساً:

يحصّر إستعمال اللقاح بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات ويمنع تسريبه إلى أي عيادة خارجية تحت طائلة المساءلة القانونية بهذا الشأن.



مدير عام وزارة الصحة العامة
الدكتور وليد عمار

يبلغ:

- مديرية الوقاية الصحية
- مصالح الصحة في المحافظات / أطباء الأفضية
- شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية
- المستودع المركزي للدواء
- منظمة الصحة العالمية
- منظمة اليونيسف
- المحفوظات